医务人员的重要信息

治疗肿瘤学家姓名：_____

工作时间电话：_____

非工作时间电话：_____

Kite CAR T 产品给药：
☐ YESCARTA®
☐ TECARTUS™

Kite CAR T 输注日期：_____

折叠

- 该患者接受了 CD19 导向的转基因自体 T 细胞免疫治疗（CAR T）。

- **CAR T 治疗可引起细胞因子释放综合征（CRS）和神经毒性，可能致命或危及生命。**
  CRS 可能涉及任何器官系统

- **请立即联系患者的肿瘤科医生以获得更多信息**

请访问 www.yescartatecartusrems.com 获取更多信息。

Patient Information

YESCARTA® and TECARTUS™ can cause side effects that can lead to death.

Call or see your oncologist or get emergency help **RIGHT AWAY** if you have any of **these symptoms**:

- Fever (100.4°F/38°C or higher)
- Difficulty breathing
- Chills or shaking chills
- Confusion
- Dizziness or lightheadedness
- Severe nausea, vomiting, or diarrhea
- Fast or irregular heartbeat
- Severe fatigue or weakness

YESCARTA, the YESCARTA Logo, TECARTUS, the TECARTUS Logo, KITE, and the KITE Logo are trademarks of Kite Pharma, Inc. GILEAD is a trademark of Gilead Sciences, Inc.

© 2021 Kite Pharma, Inc. All rights reserved. | REMS-CTF-0023 03/2021

Kite
A GILEAD Company
Santa Monica, CA

FOLD

YESCARTA® (axicabtagene ciloleucel) Suspension for IV infusion | TECARTUS™ (brexucabtagene autoleucel) Suspension for IV infusion

Patient Wallet Card

Carry this card with you at all times. SHOW THIS CARD if you go to the emergency room or see any physician.

Tell any healthcare provider that sees you that you are being treated with YESCARTA® or TECARTUS™.

Stay within close proximity (within 2 hours) of the location where you received your treatment for at least 4 weeks after getting YESCARTA® or TECARTUS™.

Important Information for Healthcare Providers

Name of treating oncologist: _____

Office phone: _____

After-hours phone: _____

Kite CAR T product administered:
☐ YESCARTA®
☐ TECARTUS™

Date of Kite CAR T infusion: _____

FOLD

- This patient has received a CD19-directed genetically modified autologous T-cell immunotherapy (CAR T).
- **CAR T therapy can cause cytokine release syndrome (CRS) and neurologic toxicities, which may be fatal or life threatening. CRS may involve any organ system**
- **Contact the patient's oncologist immediately for further information**

For more information, please visit www.yescartatecartusrems.com.

Información para el paciente

YESCARTA® y TECARTUS™ pueden causar efectos secundarios que pueden provocar la muerte.

Llame o consulte a su oncólogo o busque ayuda de urgencia **DE INMEDIATO** si tiene alguno de **estos síntomas**:

- Fiebre (100.4 °F/38 °C o más)
- Dificultad para respirar
- Escalofríos o temblores
- Confusión
- Mareos o aturdimiento
- Náuseas, vómitos o diarrea intensos
- Latido cardíaco rápido o irregular
- Fatiga o debilidad intensa

YESCARTA, el logotipo de YESCARTA, TECARTUS, el logotipo de TECARTUS, KITE, y el logotipo de KITE son marcas comerciales de Kite Pharma, Inc. GILEAD es una marca comercial de Gilead Sciences, Inc.

© 2021 Kite Pharma, Inc. Todos los derechos reservados. | REMS-CTF-0024 03/2021

Kite
A GILEAD Company
Santa Mónica, CA

DOBLAR

YESCARTA® (axicabtagene ciloleucel) Suspension for IV infusion

TECARTUS™ (brexucabtagene autoleucel) Suspension for IV infusion

Tarjeta de bolsillo del paciente

Lleve esta tarjeta con usted en todo momento. MUESTRE ESTA TARJETA si va a un servicio de urgencias o si consulta a un médico.

Informe al profesional sanitario que lo vea que está siendo tratado con YESCARTA® o TECARTUS™.

Permanezca muy cerca (a una distancia máxima de 2 horas) del lugar en el que recibió el tratamiento durante, al menos, 4 semanas después de recibir YESCARTA® o TECARTUS™.

Información importante para profesionales sanitarios

DOBLAR

Nombre del oncólogo tratante: _____

Teléfono del consultorio: _____

Teléfono después del horario de atención: _____

Medicamento T-CAR de Kite que se administró:
☐ YESCARTA®
☐ TECARTUS™

Fecha de la infusión T-CAR de Kite: _____

- Este paciente ha recibido una inmunoterapia con linfocitos T (T-CAR) autólogos, modificados genéticamente y dirigidos a CD19.

- **La terapia con T-CAR puede causar síndrome de liberación de citocinas (SLC) y efectos secundarios neurológicos, que pueden ser mortales o potencialmente mortales. El SLC puede afectar a cualquier aparato y sistema.**

- **Comuníquese de inmediato con el oncólogo del paciente para obtener más información.**

Visite www.yescartatecartusrems.com para obtener más información.